ISTRUZIONI PER LA CURA POST-UTILIZZO SEGUENTI TRATTAMENTI DENTALI

IL TUO COMFORT, LA TUA SICUREZZA E LA TUA GUARIGIONE SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

AKSU CLINIC
DENTAL ART

1 DOPO L'INTERVENTO DI IMPLANTOLOGIA DENTALE



- **Sanguinamento:**
Un lieve sanguinamento durante le prime 24 ore è normale.
Morsicare delicatamente la garza sterile per 20-30 minuti.
Evitare di sputare, sciacquare o aspirare con una cannuccia nelle prime 24 ore.

- **Gonfiore:**
Il gonfiore in genere inizia entro le prime 24 ore e può durare 2-3 giorni.
Applicare impacchi freddi sulla guancia per 10 minuti consecutivi e 10 minuti di pausa durante il primo giorno.

- **Gestione del dolore:**
Assumere puntualmente gli antidolorifici prescritti, non aspettare che il dolore aumenti.
Se il dolore o il gonfiore peggiorano dopo 3-4 giorni, contattare la clinica.

- **Igiene orale:**
NON sciacquare la bocca né spazzolare la zona chirurgica per le prime 24 ore.
Dal secondo giorno, sciacquare delicatamente con il collutorio prescritto due volte al giorno.
Lavare i denti restanti normalmente.

- **Cibo e bevande:**
Evitare cibi caldi, piccanti o duri per 3 giorni.
Scegli cibi morbidi e tiepidi (zuppe, purè di patate, yogurt, ecc.).
Non fumare né consumare alcolici per almeno 7 giorni.

- **Punti di sutura:**
I punti di sutura vengono rimossi 7-10 giorni dopo l'intervento (a meno che non siano riassorbibili).
Se un punto di sutura si allenta, di solito è normale.
In caso di dubbi, contattateci.

2 DOPO RIALZO DEL SENO PARANASALE O INNESTO OSSEO

- Non soffiarti il naso o starnutire con la bocca chiusa per 2 settimane.
- Evita di usare una cannuccia, fumare o creare aspirazione all'interno della bocca.
- Dormi con la testa sollevata per le prime notti.
- Un leggero sanguinamento dal naso o pressione nei seni paranasali è normale.
- Assumere gli antibiotici esattamente come prescritto.
- Se si verificano perdite di liquido dal naso o il gonfiore aumenta, contattare immediatamente la clinica.

3 DOPO L'OTTURAZIONE O LA PREPARAZIONE PER CORONE/FACCETTE

- Evitare di mangiare o bere per 3 ore dopo il trattamento.
- La sensibilità al freddo o al caldo è normale per diversi giorni.
- Se la masticazione risulta irregolare una volta terminato l'effetto dell'anestesia, contattateci.
- Evitare cibi appiccicosi (gomme da masticare, caramello) su otturazioni o corone provvisorie.
- Mantenere la zona pulita spazzolando delicatamente i denti e usando il filo interdentale.



Il tuo sorriso è la nostra firma

+90 533 066 9912
info@aksuclinic.com.tr
www.aksuclinic.com
@aksu.clinic

Adress: Mahmutbey, Dilmenler Cd.Doublepark Residence
D.No:30/1B, 34218 Bağcılar/Istanbul - Turkey

4 CORONE PROVVISORIE DENTIERE PROVVISORIE

- Spazzolare e risciacquare accuratamente la zona circostante i denti provvisori.
- Evitare cibi molto duri o appiccicosi che potrebbero allentare la protesi provvisoria.
- Non dormire con protesi provvisorie rimovibili. In caso di caduta di una corona o di una protesi provvisoria, contattarci immediatamente per la ricementazione.
- Una leggera sensibilità gengivale o residui bianchi sono normali e temporanei.

5 DOPO IL TUO "NUOVO SORRISO"

DEFINITIVO CORONE O FACCETTE PERMANENTI

- Evitare di mangiare e bere per 3 ore dopo la cementazione.
- Una lieve sensibilità può durare alcuni giorni: è normale.
- Mantenere un'eccellente igiene orale:
  - Lavarsi i denti due volte al giorno
  - Usare il filo interdentale o gli scovolini interdentali
  - Evitare di mordere oggetti duri, di aprire biberon o di masticare cibi molto duri.
  - Visitare il dentista una volta all'anno per una pulizia professionale e controlli.
  - Se si avverte pressione, fastidio o un cambiamento nel morso, contattare la clinica.

6 LINEE GUIDA PER I FARMACI



- **Antibiotici:**
  Assumere ogni 12 ore fino al completamento del ciclo completo.
- **Antidolorifici:**
  Assumere ogni 6-8 ore come prescritto, durante il pasto.
- **Collutorio:**
  Iniziare 24 ore dopo l'intervento chirurgico. Usare due volte al giorno per 7-10 giorni.
- **Probiotici (facoltativi):**
  Raccomandati durante l'assunzione di antibiotici per favorire la salute intestinale.

7 RACCOMANDAZIONI GENERALI

- Mantenere un'eccellente igiene orale per una guarigione rapida e agevole.
- Evitare di fumare, poiché rallenta la guarigione e aumenta il rischio di infezioni.
- Mantenersi idratati e riposare a sufficienza.
- Contattare immediatamente la clinica se si verificano:
  - Dolore intenso
  - Sanguinamento eccessivo
  - Gonfiore persistente
  - Febbre
  - Sintomi insoliti